

FRENDIX[®] **FLUOXETINA 20 mg**

Antidepresivo

Comprimidos Vía Oral

Composición:

Cada comprimido contiene:

Fluoxetina Clorhidrato..... 20 mg.

Excipientes..... c.s.p.

Indicaciones: Depresiones moderadas, trastornos de pánico, trastornos obsesivo compulsivos.

Posología y Vías de Administración: Dosis usual es de 20 mg. día vía oral por la mañana, debe considerarse su incremento si después de varias semanas de tratamiento no se observa mejoría clínica. Las dosis superiores (hasta 80 mg/día) deben administrarse en dos tomas por la mañana y durante el almuerzo. Luego de la remisión del cuadro debe utilizarse la menor dosis efectiva para el tratamiento de la mejoría clínica.

Reacciones Adversas: Dolor de cabeza, nerviosismo insomnio, somnolencia, sedación, ansiedad, temblores, mareos, fatigas, disminución de la concentración, sueños anormales, enrojecimiento y sensación de calor, palpitaciones, sudoración, erupción, prurito, náuseas, diarrea, boca seca, anorexia, dispepsia, estreñimiento, dolor abdominal, vómito, cambio en los sabores, flatulencia, gastroenteritis, mal funcionamiento sexual, infección del aparato urinario, micción frecuente, menstruación dolorosa, dolor en los músculos y articulaciones, astenia, fiebre, dolor de tórax, alergia, pérdida de peso.

Contraindicaciones: La Fluoxetina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a la misma. Niños menores de 15 años.

Precauciones y Advertencias: Advertir a los operadores de maquinas y conductores de vehículos sobre el riesgo de somnolencia. En los diabéticos puede ser necesario el ajuste de las dosis de insulina o de hipo-glucemiantes orales.

Como un porcentaje sustancial de los pacientes que toman Fluoxetina pueden experimentar ansiedad, nerviosismo, insomnio, es conveniente tomar precauciones y administrar el medicamento durante la mañana para evitar perturbaciones y

sueño. Evitar la ingestión de bebidas alcohólicas.

Restricciones de uso: Pacientes embarazadas y durante la lactancia. Niños menores de 15 años.

Interacciones Medicamentosas: la gran afinidad de la Fluoxetina por las proteínas plasmáticas y su importante metabolismo hepático hacen pensar que las interacciones con otras drogas se producen por desplazamiento o por la competición enzimática. En dosis terapéuticas no inhibe el metabolismo del etanol ni interactúan el lo suficiente como para potenciar sus efectos centrales.

La Fluoxetina altera las variables farmacocinéticas de los barbitúricos en la rata, pero en los seres humanos los resultados obtenidos no son concluyentes. Por otra parte prolonga la vida media plasmática de la Warfarina, se prolonga de 8 a 22 horas. Se evaluaron los efectos colaterales en pacientes que simultáneamente estaban recibiendo los siguientes fármacos: antiácidos, antibióticos, antihistamínicos, agentes bloqueantes beta adrenérgicos, bloqueantes de los receptores H1, catárticos, hidratos de cloral, cimetidina, antiinflamatorios orales, diuréticos, tiazídicos, antiinflamatorios no esteroides, hormonas tiroideas, antidiarreicos, antieméticos, antiparkinsonianos, barbitúricos, broncodilatadores, hipoglucemiantes, litio, opiáceos, cloruro de potasio, glucocorticoides. Si bien se observan algunos efectos adversos esto no difirieron del patrón habitual esperable para cada una de estas drogas. La administración combinada con otros antidepresivos puede aumentar los niveles plasmáticos de estos. Otro tanto es posible con la digitoxina y los anticoagulantes. En algunos pacientes aumenta la vida media plasmática de diazepam.

Sobredosificación: En caso de sobredosis puede manifestarse con agitación, inquietud, hipomanía y otros. Excitación del SNC y en pacientes que tomaron dosis altas de fluoxetina, náuseas y vómitos. Como tratamiento se recomienda despejar las vías respiratorias y mantenerse así, asegurar una buena ventilación

En caso de ingesta accidental o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Emergencia Médica Prof. Luis María Argaña. Dirección: Avda. Gral. Santos y Manuel Domínguez. TEL. 204-800.

Conservación: Almacenar en lugar fresco y seco a no más de 25 °C. Proteger de la luz.

Presentación: Envase conteniendo 30 comprimidos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

VENTA BAJO RECETA



Elaborado por CORPEXIM S.A. Para su Div. Whelp Paraguay. Avda. Molas López 1991 c/ Sacramento
Tel: (595 21) 297 208. D.T.: Farm. Hugo Saldivar G. Reg. N° 2828. Asunción - Paraguay
INDUSTRIA PARAGUAYA