

## NERFANIL® Bromazepam

*Ansiofítico.*

### Composición:

Nerfanil 3mg.  
Bromazepam..... 3 mg  
Excipientes.....c.s.p.

Nerfanil 6 mg  
Bromazepam..... 6 mg  
Excipientes..... c.s.p.



### Indicaciones:

Nerfanil esta indicado para tratar los Trastornos de Ansiedad, angustia, obsesión, compulsiones, fobias e hipocondrías. Tratamiento de las reacciones emocionales provocadas por situaciones conflictivas y de estrés. Trastorno adaptativo con estado de ánimo ansioso. Ansiedad secundaria a otro Trastorno Mental (por ej. Depresión), a Abuso de Sustancias o a Enfermedad Médica (por ej. Hipertiroidismo). Síndrome de Abstinencia Alcohólica. Insomnio por ansiedad o situaciones pasajeras de estrés.

### Posología y Forma de administración:

Los pacientes geriátricos o debilitados, los niños o los pacientes con disfunción renal hepática, deben recibir una dosis inicial reducida, 1.5 mg c/24hr, hasta un máximo de 6 mg c/8 h. (18 mg/día) por que en estos puede estar disminuida la eliminación.

Dosis usual para adultos: Pacientes dosis media: 1,5 a 3 mg, tres veces/día. Comenzar con dosis bajas que se irán incrementando hasta obtener el efecto óptimo. Pacientes internados: de acuerdo al criterio médico) 6 a 12 mg, dos o tres veces por día. No obstante lo indicado, la dosis se establecerá individualmente con incrementos graduales hasta lograr el nivel óptimo.

Dosis pediátricas usuales: de ser necesario el uso en niños, la posología se debe ajustar al menor peso corporal.

Duración del tratamiento: lo más corto posible, con reevaluación periódica de la necesidad del

tratamiento.

Por lo general la duración global de la terapia no debe exceder de 8 a 12 semanas. Incluida la fase de retirada gradual de la medicación.

### Reacciones Adversas:

Se tolera bien, incluso en dosis más altas que las terapéuticas. En los pacientes ancianos o debilitados se recomienda dosificar en forma más cautelosa, dada la sensibilidad variable de estos pacientes a los fármacos psicotrópicos. Dependencia: el consumo de benzodiazepinas puede producir dependencia. Este riesgo es mayor con el uso prolongado, las dosis altas y en los pacientes predispuestos, a saber con antecedentes de alcoholismo, de abuso de fármacos, pacientes con trastornos graves de la personalidad u otro tipo de trastorno psiquiátrico. En general debe evitarse la suspensión brusca del tratamiento para prevenir los síntomas de abstinencia. Su suspensión puede causar inquietud, ansiedad e insomnio.

### Precauciones y Advertencias:

Los pacientes deberán evitar la ingestión de alcohol. El Bromazepam puede modificar las reacciones del paciente (habilidad para conducir, conductas) de forma variable según la dosis empleada, la administración y la idiosincrasia individual. No se recomienda interrumpir el tratamiento en forma brusca sino de manera gradual. Reacciones adversas Frecuentes: somnolencia, confusión y ataxia, especialmente en ancianos y debilitados; si persiste estos síntomas se debe reducir la dosis. Ocasionales: mareos, sedación, cefaleas, depresión, desorientación, disfasia, disartria, reducción de la concentración, temblor, cambios en la libido, incontinencia urinaria, retención urinaria, náuseas vómitos, diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, hipersalivación, dolor epigástrico.

### Interacciones:

El uso simultáneo de otros depresores del SNC, como neurolépticos, tranquilizantes, antidepresivos, hipnóticos, analgésicos y anestésicos, puede incrementar su efecto

sedante, lo que en algunos casos puede ser utilizado terapéuticamente.

**Contraindicaciones:**

Miastenia gravis. Se evaluará la relación riesgo-beneficio durante el embarazo y período de lactancia. Hipersensibilidad a las Benzodiazepina.

**Sobredosificación:**

**En caso de ingesta accidental o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Emergencia Medica Prof. Luis María Argaña. Dirección: Avda. Gral. Santos y Manuel Domínguez. TEL. 204-800**

**Conservación:**

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz.

**Presentaciones:**

Envase conteniendo 30 comprimidos.

Envase conteniendo 60 comprimidos.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MEDICA.**

**VENTA BAJO RECETA SIMPLE ARCHIVADA.**



Elaborado por CORPEXIM S.A. Para su Div. Whelp Paraguay. Avda. Molas López 1991 c/ Sacramento  
Tel: (595 21) 297 208. D.T.: Farm. Hugo Saldivar G. Reg. N° 2828. Asunción - Paraguay  
**INDUSTRIA PARAGUAYA**