

TRIPTIL® AMITRIPTILINA 25 mg

Antidepresivo.

COMPRIMIDOS VIA ORAL



Composición:

Cada comprimido contiene:

Amitriptilina HCl..... 25 mg.

Excipientes..... c.s.p.

Indicaciones:

Triptil, está indicado en el tratamiento de las enfermedades depresivas tales como: Depresión Mayor, Trastorno Bipolar (en fase depresiva), trastornos depresivos en la psicosis. Estados de ansiedad asociados con depresión. Depresión con signos vegetativos.

Posología y forma de administración:

Se puede tomar este medicamento con alimentos o un vaso de agua o leche, para disminuir la irritación gástrica.

Dosis:

Adultos: oral inicialmente 25 mg 2 a 4 veces al día ajustando la dosis según necesidades y tolerancia.

Ancianos y pacientes debilitados: en general dosis más bajas se recomiendan para estos pacientes, inicialmente 25 mg al acostarse, aumentando la dosificación hasta 10 mg 3 veces al día, y 20 mg al acostarse, según necesidades y tolerancia. Niños y

adolescentes: en niños de 12 a 17 años, una dosis inicial de 10 mg tres veces al día y 20 mg al acostarse. La dosis puede ser aumentada, según necesidades y tolerancia, hasta un máximo de 100 mg al día.

Dosis límites para adultos: Pacientes ambulatorios hasta 150 mg por día. Pacientes hospitalizados hasta 300 mg por día. Pacientes de edad avanzada hasta 100 mg por día.

Interacciones:

Los corticoides, antihistamínicos o antimuscarínicos potencian los efectos antimuscarínicos. El uso simultáneo con Atropina puede bloquear la destoxificación de la Atropina. Aumenta la acción de los anticoagulantes. Potencia la depresión del SNC, lo que disminuye el umbral de las crisis convulsivas a dosis elevadas y disminuyen los efectos de la medicación

anticonvulsiva. El uso simultáneo con antitiroideos puede aumentar el riesgo de agranulocitosis. Los efectos de los antidepresivos tricíclicos pueden estar disminuidos cuando se usan con barbitúricos.

La cimetidina inhibe el metabolismo de la Amitriptilina y aumenta su concentración plasmática. Otros depresores del SNC potencian su acción. No se recomienda su uso con IMAO debido al aumento del riesgo de convulsiones severas y crisis hipertensivas. Se potencian los efectos presores de nafazolina oftálmica, oximetazolina nasal, fenilefrina nasal u oftálmica o xilometazolina nasal. El uso concomitante con drogas simpaticomiméticas puede potenciar los efectos cardiovasculares y dar lugar a arritmias, taquicardia o hipertensión.

Contraindicaciones:

Está contraindicada su prescripción durante el período de recuperación inmediato al infarto de miocardio. Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio en alcoholismo activo o tratado, asma, enfermedad maniaco depresiva o bipolar, trastornos hemáticos, alteraciones cardiovasculares sobre todo en ancianos y niños, glaucoma, disfunción hepática o renal, hipertiroidismo, esquizofrenia, crisis convulsivas, retención urinaria. Se ha sabido de pacientes con hipersensibilidad a la droga o hipersensibilidad a los antidepresivos tricíclicos. La Amitriptilina no se debe administrar junto con, o dentro de 14 días del tratamiento con un IMAO.

Precauciones y Advertencias:

Evitar la ingestión de bebidas alcohólicas. Es posible que se presente somnolencia, por lo que se deberá tener precaución al conducir. No suspender la medicación abruptamente.

Embarazo: No se han realizado estudios adecuados, por lo tanto, no se recomienda su uso durante la gestación.

Lactancia: No se han descriptos problemas humanos, no obstante tener presente que la Amitriptilina se ha encontrado en la leche materna.

Pediatría: No se recomienda su uso en menores de 12 años. Los pacientes de edad avanzada necesitan a menudo una reducción de la dosis debido a la lentificación del metabolismo o de la excreción. Asimismo muestran un aumento de la

sensibilidad a los efectos antimuscarínicos, tales como retención urinaria o delirio anticolinérgico.

Reacciones Adversas:

Visión borrosa; movimientos de masticación, succión, linguales; movimientos incontrolados de las piernas o brazos; confusión, delirio, alucinaciones. Constipación, sobre todo en ancianos. Dificultad al hablar o tragar. Nerviosismo. Agitación. Rigidez muscular. Fotosensibilidad. Crisis convulsivas. Sudoración excesiva. Pirosis. Vómitos. Las siguientes reacciones indicarán suspensión del tratamiento: náuseas, vómitos, diarrea, excitación no habitual, perturbaciones del sueño.

Sobredosificación: En caso de ingesta accidental o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Emergencia Médica Prof. Luis María Argaña. Dirección: Avda. Gral. Santos y Manuel Domínguez. TEL. 204-800.

Presentación:

Cajas conteniendo 50 comprimidos.

Conservación:

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA.

VENTA BAJO RECETA SIMPLE ARCHIVADA.



Elaborado por CORPEXIM S.A. Para su Div. Whelp Paraguay. Avda. Molas López 1991 c/ Sacramento
Tel: (595 21) 297 208. D.T.: Farm. Hugo Saldivar G. Reg. N° 2828. Asunción - Paraguay
INDUSTRIA PARAGUAYA